

**DE PRIMULIS
ITALICIS
TENTAMEN
INAUGURALE
QUOD...**

Alessandro Lattuada



DE
PRIMULIS ITALICIS
TENTAMEN INAUGURALE

QUOD

ANNUENTIBUS MAGNIFICO DOMINO RECTORE
PERILLUSTR. FACULTAT. MEDIC. DIRECTORE
SPECTAB. D. DECANO NEC NON CLARISSIMIS
D. D. PROFESSORIBUS

AUSPICE
JOSEPHO MORETTI

OECONOM. RURAL. P. PROF. ET BOTANIC. SUPPL.

PRO DOCTORIS MEDICINAE LAUREA

RITE CAPESSENDA IN CELEBRATISS. I. R. ARCHIGYMN. TICINENSIS

Mense Aprilis an. M. DCCC. XXXI

UNA CUM THESISIBUS ADNEXIS

PUBLICÆ DISQUISITIONI SUBMITTERAT

ALEXANDER LATTUADA

EX CARONNO IN PROV. MEDIOL.



TICINI REGII

Ex Typographia Fusi et Socii.



Santh...

PROOEMIUM.

Quum crebra Primulacearum familia praesertim penes italos sit propagata, plurimae praeterea species cum aliis confundantur, permultae nundum plane innotescant, aliaeque demum haud congrue descriptae occurrant; idcirco rei botanicae cultoribus acceptum offerre opus autumo, quod justam respiciat monographiam de variis primularum speciebus, quae in hac nostratum peninsula gliscunt. Quod quidem eo libentius suscepti, quatenus mihi talia lucubranti maximum praesidium clarissimus Professor *Moretti* est impertitus, cujus Viri doctrinam, et in

814
perutilibus peregrinationibus solertiam aequae ac comitatem indesinenter reverebor et magni faciam.

Parumper in usum medicum primulae adsciscuntur, immo duntaxat *Primula officinalis* et *Primula Auricula*; quapropter de hisce singillatim fusius eloqui mihi mens est; et sic academico, quo obstringor, muneri pro virium modulo defungar.

PRIMULA.

- Linn.* Gener. plant. n. 197. p. 80. ed. *Schreb.* u. 258.
Lam. Illustr. t. 98. *Gaert.* Fruct. t. 50. *Juss.*
Gen. p. 108. *Jaum S. Hill.* Fam. 1. pag. 222.
De Cand. Fl. fr. 3. p. 444. *Lehm.* Mon.
Primula veris et *Auricula Tournefort*, Inst. t. 46. 47.

CHARACTER GENERIS.

Invol. umbellulae polyphyllum in quibusdam speciebus 1—2 phyllum minimum.

Cal. perig. inferum gamosepalum tubulatum in nonnullis speciebus pentagonum persistens plus minusve quinquedentatum sive quinquefidum laciniis erectis.

Corol. gamopetala infera hypocrateriformis s. infundibuliformis. Tubus cylindricus longitudine calycis, s. 2—3—4plo longior, collo parvo hemisphaerico terminatus. Limbus patens quinquefidus, in quibusdam speciebus basi annulo spongioso: laciniis aequalibus obcordatis emarginatis s. semibifidis obtusis. Faux pervia in nonnullis speciebus villis albidis tecta.

Stam. filamenta quinque subulata in collo corollae. Antherae oblongae acuminatae erectae conniventes inclusae.

Pist. ovarium superum globosum vel oblongum. Stylus filiformis longitudine fere tubi. Stigma globosum.

Peric. capsula subrotunda s. ovata s. oblonga s. conica s. cylindrica longitudine fere perianthii s. duplo longior, unilocularis, apice dentibus decem dehiscens.

Sem. numerosa subrotunda glabra s. rugoso-scariosa margine saepe membranaceo cincta, receptaculo centrali ovato-oblongo libero adfixa.

1. *Primula vulgaris* Huds.

- P. foliis* obovato-oblongis dentatis, crosis, subtus villosiusculis, scapis unifloris, corollae limbo plano.
- P. vulgaris* Huds. Fl. angl. p. 83. Pollin. Fl. veron. 1. p. 226. n. 322. Sav. Bot. etrusc. 1. p. 128. Nocc. et Balb. Fl. tic. 1. p. 94.
- P. sylvestris* Scop. Flor. carniol. 1. p. 132. n. 204.
- P. acaulis* Allion. Fl. ped. 1. p. 91. n. 331. Guss. Fl. sic. 1. p. 228. Sebast. et Maur. Fl. rom. pr. p. 95. n. 250. Lehm. monog. n. 5.
- P. grandiflora* Lam. Fl. franc. 2. p. 243. Dub. Bot. gal. 1. p. 384.
- P. brevistyla* Dec. Fl. fr. suppl. p. 383.
- P. bicolor.* Rafin. Caratt. nuov. gen. p. 78. t. IX. f. 3.
- P. veris* γ . *acaulis* Linn. sp. pl. p. 205.
Alisma sylvarum Column. Phytobaz. ed. 1. p. 21. t. 6. f. 1.
 Habitat in sylvis, et dumetis; vulgarissima.

2. *Primula officinalis* Jacq.

- P. foliis* dentatis rugosis in petiolum subcoarctatis obtusis, scapo multifloro, floribus nutantibus secundis, corollae limbo concavo.
- P. veris* α Linn. Spec. pl. p. 204. Lehm. monog. n. 4. Comoll. Com. pr. p. 31. n. 213.
- P. officinalis* Jacq. Misc. austr. 1. p. 159. n. 3. Allion. Fl. ped. 1. p. 91. n. 332. Pollin. Flor. veron. 1. p. 226. n. 323. Morett. notiz. piant.

vicent. ed. 1. p. 7. n. 15. ed. 2. in Memor. 1. p. 249. n. 15.

Alisma pratorum *Column.* Phyt. p. 21. t. 6. f. 2.

Species praecedenti rarior. In montibus collibusque crescit, ast aequum agrum, ut *P. vulgaris* non petit. In regionibus itaque, quibus tamquam medicamen adhibetur, in viridariis colitur, plures et per differentem corollae colorem harum varietates agnoscuntur.

3. *Primula elatior* *JACQ.*

P. foliis dentatis rugosis, subcordatis, petiolatis, scapo multifloro, corollae limbo plano.

P. veris β *elatior* *Linn.* Sp. pl. 1. p. 204. *Petagn.* Instit. bot. 2. p. 331.

P. elatior *Jacq.* Miscell. austr. 1. p. 158. *Pollin.* Flor. ver. 1. p. 227. n. 324. (exclus. *Synon.* Flor. ticin.) *Comol.* Com. pr. p. 32. n. 219. *Lehm.* Monogr. p. 33. n. 6. (exclus. *Synon.* *Tenor.* Fl. napol.) β , calycibus 5-partitis.

P. Flüggeana *Lehm.* monogr. p. 36. n. 7.

P. Perreiniana *Flugg.* Ann. du Mus. 12. p. 420. t. 37. ic. bona.

Provenit in omnibus nostris alpibus etiam non tam elatis a monte *Cenisio* usque ad *Cren.* Varietas β . apud Bassanum reperitur (*Morett.* Hort. sicc.)

4. *Primula Columnae* TENOR.

- P. foliis cordato-ovatis, dentatis, villosis, subtus albo tomentosis; scapo centrali multifloro; tubi corollae fauce hemisphaerica.*
- P. columnae Tenor.* Fl. nap. prodr. 1. p. xiv. pag. 54. n. 50. t. 13. Flor. medic. 1. p. 124. *Morett.* Osserv. all. Fl. veron. p. 29.
- P. suaveolens Bertol.* Am. it. p. 95. *Röem. et Schult.* Syst. veg. 4 p. 133. *Spr.* Syst. veget. 1. p. 573. *Pollin.* Fl. veron. 1. p. 231 *Lehm.* Monogr. 25. n. 2. t. 1. fig. bona.
- P. clatior Bertol.* Pl. gen. p. 36. n. 70. *Nocc. et Balb.* Fl. tic. 1. p. 94. (exclus. Synon.)
- P. elatior γ. Columnae Lehm.* Monogr. p. 54.

Nascitur in Apenninis praetutian; (*Colonna, Tenore*); vulgatissima in montibus di *Lesime* et *Boglelio* (*Balbis, Moretti, Vittadini, Balsamo, Génè, Tatti*).

5. *Primula Auricula* LINN.

- P. foliis ovato-spathulatis sessilibus glabris farinaceis, scapo centrali farinoso, involucri foliolis brevissimis rotundatis, calycibus pulverulentis.*
- P. Auricula α Linn.* Sp. pl. 1. p. 205. *Lehm.* Monogr. p. 40. n. 10. *Petagn.* Instit. 2. p. 332. *Tenor.* Fl. nap. 1. p. 56. n. 51. *Pollin.* Fl. veron. 1. p. 229. n. 328. (exclus. var. ζ.) *Ber-*

tot. Am. ital. p. 341. *Comol. Com. pr.* p. 31.
n. 216.

P. lutea Vill. Fl. delph. 2. p. 469.

Habit. in Alpibus et Appenninis haud rara.

6. *Primula marginata* CURT.

P. foliis lanceolato-ovatis, obtusis, crenato-dentatis glabris albo-marginatis, scapo multifloro, corollae limbo plano.

P. marginata Curt. Botan. mag. 191. *Balb. miscel.* alter. p. 9. *Lehm. mon.* p. 47. n. 14. *Weld.* mont. ros. p. 66.

P. Auricula Vill. Dauph. 2. p. 469. fid. spec. in Herb. *Bosc.* nunc Prof. *Morett.*

P. crenata Lam. Ill. gen. n. 1936. t. 98. f. 3. *Dec.* Fl. fr. 3. p. 448.

In alp. Valderii di *Entraque* (Bertero!); ad rupes locis umbrosis maritimarum alpium ubique (Balbis! Gay! *Morett.* Hort. sicc.)

7. *Primula ciliata* MORETT. non SCHRANK.

P. foliis obovatis obtusis grosse-serratis margine ciliatis, umbella erecta, lacinii calycinis ovatis pubescenti-villosis.

P. ciliata Morett. Notiz. piant. Vicent. (1815) pag. 7. ic. ed. 2. in Mem. 1. p. 249. n. 16. ic. bona.

P. Balbisii Lehm. Monog. (1817) p. 45. n. 12. *Sprengel* Syst. veget. 1. p. 574.

P. Auricula var. 2. *Pollin.* Fl. veron. 1. p. 229.

3. foliis integerrimis. *Morett.* l. c. p. 250.

Habitat in monte Summano (*Moretti!*); in alp. Tirol. (*Cristofori!* in herbar. *Mor.*)

8. *Primula palinuri* PETAGN.

P. foliis obovato-spathulatis crenatis glabris, scapo laterali foliis longiore, corollae limbo plano.

P. palinuri *Petagn.* Instit. botan. 2. p. 332. *Tenor.* Flor. napol. 1. p. 56. t. 14. *Jacq. fil.* Eclog. bot. 1. p. 63. t. 43.

Alisina sive Damassonium Dioscoridis *Column.* Phytobaz. ed. 1. p. 18. t. 17. ed. *Planc.* p. 14. t. 5.

In rupibus Palinuri Calabriae abunde provenit (*Petagna, Tenore, Morett.* Hort. sicc.)

Radix crassa, carnosa, fibrillis ornata, odora, acris. Folia radicalia e gemmulis radicis in rosulam conformata, spathulata, serrata, in petiolum decurrentia, glabra, succulenta, viridi-flavescencia. Scapus solitarius non e centro, sed e latere foliorum assurgens; teres, pedalis et ultra. Inflorescentia umbellata, umbella ad meridiem quantante. Involucrum polyphyllum, unico foliolo majore, ejusdem naturae et formae ac folia radicalia, persistens. Flores ad 50. pedunculati, farina alba obtecti, et foliolis receptaculi tamquam bracteis distincti. Calyx floris semi-5-fidus, etiam octofidus, campanulatus, angulatus, farinosus persistens. Corolla lutea tubo longissimo, fauce ven-

triosa, limbo infundibuliformi, angulato quinquefido, laciniis ovatis, emarginatis. In fauce hiantē annulus elevatus glandulosus maculis albis pulverulentis. Stamina brevissima tubo corollae inserta. Antherae erectae biloculares. Stylus persistens. Stigma capitatum. Calyx fructus globosus, quinquedentatus, capsulam sphaericam unilocularem tegens. Semina plurima receptaculo fungoso affixa. *Petagn.* l. c.

9. *Primula integrifolia* LINN.

P. foliis ellipticis integris ciliatis, umbella pauciflora, calycibus tubulosis 5-fidis obtusissimis.

P. integrifolia Linn. Sp. pl. 1. p. 205. *Comol.* Com. pr. p. 31. n. 217. *Pollin.* Fl. veron. 1. p. 230. n. 330. (non *Marzari*) *Gaudin.* Fl. helv. 2. p. 93. n. 448. (exclus. synonym. *Flor. Danic.*) *Reichenb.* Pl. crit. cent. 6, t. 584. f. 802-3. (P. Candolleana) fid. *Gaudin.*

Habitat in cacuminibus alpium della *Spluga*, *Braulio* etc. (*Lanfossi!*); *Comollius!* legit in alpe comensi Legnone, et teste *Pollinio* oritur in pascuis Baldi et summani mont.

10. *Primula Polliniana* MORETT.

P. foliis obovato-obtusis, integris, glabris crassiusculis, umbella 3-5-flora erecta, calycibus tubulosis 5-fidis. *Morett.* Fl. ital. ined. ex ej. Hort. sicc.

- P. carniolica* *Pollin.* Fl. veron. 1. p. 231. n. 331.
non *Jacquin*, nec *Willden.*
- P. integrifolia* *Marzar!* El. vicent. p. 22. *Turr.* Veg.
Mont. Bald. in Giorn. d'Ital. 1. p. 119. n. 32.
Flor. ital. prod. p. 20. (non *Linn.*)
an *P. venusta* *Host.* Flor. austr. 1. p. 248?
Auricula ursi flore purpureo *Seguier* Pl. veron.
1. p. 199. n. II.

Haec species a praecedenti differt, ex eo quod
calyces tubulosos, longos, folias obovatas subter-
que nervoso-venosas, exhibet.

Provenit etiam una cum *P. ciliata* n. 7. in pratis
Montis Summani, nec non super Baldum alios-
que Tirolis italici montes. Floret Aprili, Majo.

11. *Primula glaucescens* MORETT.

- P. foliis lanceolatis vaginantibus lucidis, integerrimis,*
marginibus albo cartilagineis, subtus laevissime mul-
tinerviis glaucescentibus, calycibus profunde 5-
fidis, acutis, coloratis *Morett.* Pl. ital. dec. IV.
(1822) p. 9. n. 35. *Sprengel* Syst. veg. 1.
p. 576. *Comol.* Com. prodr. p. 31. n. 218.
- P. calycina* *Duby*, ap. *Gaudin* Fl. helvet. (1828)
2. p. 94. n. 449. *Reichenb.* pl. crit. Cent. 1.
p. 32. t. 34. f. 70.
Mert. et Koch Deutschl. Fl. 2. p. 116. n. 596.
excl. syn. *Sturm.*
- P. carniolica!* *Mairon.* Berg. ed. 2. p. 44. (non *Jacq.*)

Radix carnea, nigra, crassitie digiti minimi, oblique se erigens, fibris longis subdivisis praedita. Folia confertissima in modum rosae disposita, vaginantia, lanceolata, acuta, supra lucida, subtus glaucescentia, leviter multinervia, nervis simplicibus oblitteratis, margine subintegerrimo, albo. Scapus 4-uncialis, teres crassitie aequalis, superne nutans, glaber. Involucrum 3-phyllum, foliolis erectis lineari-subulatis, subviolaceis. Umbella subtriflora; pedunculis inaequalibus semiuncialibus, involucri brevioribus. Calyx tubulosus, erectus 5-partitus, coloratus; laciniis lanceolatis, acutis. Corolla hypocrateriformis purpureo-violacea; limbo plano, laciniis subbilobis, obtusis. Stamina brevissima in fundo tubi exposita, quorum antherae oblongae tenuissimo filamento insertae. Stylus erectus, filiformis longitudine fere laciniarum calycis: stigma globosum. Capsula globosa.

Obs. Unica species cum qua haec conferri potest, est *primula integrifolia* Linn. Attamen ab ipsa differt, quod exhibet folia lanceolata, non elliptica, calyces 5-partitos laciniis acutis, non quam maxime obtusis. Dein foliorum color in nostra specie glaucescens, sed in *Primula integrifolia* viridi fuscus, alteram facile ab altera distinguit. l. c.

Praecept. Morett. ait: jam ab annis triginta optimus praeceptor, et amicus meus Professor *Scannagata* pulcherrimam hanc speciem monte *Corni di Canzo* in superiori agro mediolanensi

evulsit. Absente anno 1819. *D. Duby* botanicus genevensis nonnulla hujusce plantae specimina in eodem monte collecta mihi largitus est; et hoc anno egomet ipsam florescentem inveni mense maii in peregrinatione botanica una cum clavis. Dynaste chiliarco *De Weldenio* illuc peracta.

12. *Primula carniolica* JACQ.

P. foliis ellipticis integerrimis glabris in petiolum dilatatum desinentibus, umbella pauciflora, calycibus brevissimis.

P. carniolica Jacq. Flor. austr. 5. app. p. 28. t. 4. *Host.* Synops. austr. p. 98. ed. 2. 1. p. 250.

P. integrifolia Scopol. Fl. carniol. ed. 2. 1. p. 133. n. 208. exclus. omnib. synonym.

Habit. in monte Cren (*Morett.* Hort. sicc.)

13. *Primula glutinosa* JACQ.

P. foliis oblongis, obtusis, glutinosis apice serratis, involucri foliolis coloratis maximis.

P. glutinosa Jacq. Fl. austr. app. p. 41. t. 26. *Pollin.* Flor. veron. 1. p. 228. n. 327.

Auricula ursi septima Clus. Hist. 1. p. 304.

In alpibus Tirolensibus, praesertim della valle *Sugana*, reperitur (*Pollini* l. c.) *Morettius* legit in alpibus Carinthiacis et Stiriacis.

Omnibus hujus generis speciebus praesens odorosior est, et proprietatibus medicinalibus forsan

praestantioribus pollet. Usque vero ad hoc tempus nullo medico adhibita fuit. A Tirolensibus in commercium traditur atque ad Constantinopolim mittitur, ubi pharmacopolae destillationis ope odorosum ex ea liquorum eliciunt. (*Parolini ex Mor. Hort. sicc.*)

14. *Primula viscosa* ALLION.

P. foliis obovato-linguiformibus subsinuatis integerrimis villosa-viscosis, umbella erecta pubescente multiflora, calycibus brevissimis.

P. viscosa *Allion*. Fl. ped. 1. p. 93. n. 338. fig. 1.
Lehm. Monog. p. 71. n. 31.

Habitat ad rupes circa thermas Valderii (*Bertero!* in herb. *Morett.*)

15. *Primula mycrocalyx* LEHM.

P. foliis obovato-cuneiformibus profunde dentatis glabris, umbella multiflora, involucri foliolis rotundato-ovatis minimis, calycibus brevissimis hyantibus *Lehm.* Monogr. primul. n. XIII. p. 46. t. IV.

P. marginata β mycrocalyx *Morett.* Fl. ital. ined. ex ej. Hort. sicc.

Hab. ad rupes in alp. Valderii di Entraque (*Bertero!* in Herb. *Morett.*)

16. *Primula villosa* JACQ.

- P. foliis ovatis cuneatisve superne crenato-serratis obtusissimis, viscidis, glanduloso-pubescentibus, calycibus campanulatis tubo fere triplo brevioribus.*
- P. villosa* Jacq. *Miscell.* 1. p. 159. *Flor. austr.* 5. app. 1. 27. *Morett.* *Notiz. in mem.* 1. p. 248. *Pollin.* *Fl. ver.* 1. p. 228. n. 326. *Duby. et Decand.* *Bot. gall.* 1. p. 384. n. 6. *Lehm.* *Monogr.* p. 77. n. 35. *Comol.* *Com. pr.* p. 31.
- P. viscosa* Vill. *Dauph.* 2. p. 467. *Decand.* *Fl. fr.* 3. p. 449. n. 2372. *Gaud.* *Fl. helv.* 2. p. 89. n. 445.
- P. hirsuta* Allion. *Fl. ped.* p. 93. n. 337. *Villars.* *Dauph.* 2. p. 469.
- P. pubescens* Lehm. *monogr.* p. 75. n. 34. *Re Flor. segus.* p. 19.
- P. ciliata* Schr. *Fl. salisb.* n. 186. *Lehm.* *monogr.* p. 79. n. 36. *Braun!* *Salzb. Fl.* 1. p. 162.
- P. latifolia* Lap. *Abr. de Pyren.* p. 97. *Fid. specim. in Herbar. Bosc. nunc Praecept. Morett.*

Habitat in alpihus pedemontii; in *Legnone*, *Sempronio*, *Vette di Feltre* etc. Provenit adhuc in montibus editioribus *vallem Trompia* dictam circumdantibus provinciae Brixienensis praesertim in rupibus montis *Muffetto* (*Zantedeschi!* *De Notaris!* *Comolli!* *Badarò!* *Bertero!* *Morett.* *Hort. sicc.*)

17. *Primula Allionii* Lois.

P. foliis obovato-cuneiformibus pubescenti-glutinosi subintegris incanis, scapo 1-2-floro foliis brevioribus, calycibus ovatis obtusis tubo vix triplo brevioribus. *Lehm. Monogr. p. 83. n. 38.*

P. Allionii Lois. Notic. p. 38. t. 3. f. 1.

P. glutinosa Allion. Auct. Fl. ped. p. 6. n. 338. (non Jacquin.)

Habitat in fissuris rupium locis umbrosis, quae pluvia non aluit, neque sol percellit, circa la Madonna delle fenestre (*Allioni, Balbis! Moretti Hort. sicc.*)

18. *Primula minima* LINN.

P. foliis nitidis cuneiformibus apice argute serratis, scapo paucifloro, corollae laciniis semibifidis Γ graecum referentibus, fauce villosula.

P. minima Linn. sp. pl. 1. p. 204. Lehm. monogr. p. 85. n. 39. Pollin. Fl. veron. 1. p. 230. n. 329. Suffr. Frioul. p. 205. Sternb. Reis. in die Rhet. alp. p. 59.

In montibus tirolensibus della valle Sugana; (*Pollini*), et teste *Cernazajo* oritur in Carniae montibus.

19. *Primula farinosa* LINN.

P. foliis cuneato-lanceolatis rugosis crenato-dentatis, subtus farinosis, umbella erecta, corollarum limbo plano.

P. farinosa Linn. sp. pl. 1. p. 205. *Lehm. monogr.* p. 52. n. 17. *Pollin. Fl. veron.* 1. p. 228. n. 325. *Suffr. Frioul.* p. 121. *Birol. Fl. acon.* 1. p. 65. *Allion. Fl. ped.* 1. p. 92. n. 334. *Re Flor, segus.* p. 19. *Ucr. Hort. panhorm.* p. 86?

In omni alpium catena, et usque ad planitiem descendit.... Ubi copiose nascitur in pratis, ibi semper indicat solum udum spongiosum. *Lehm. l. c.*

20. *Primula longiflora* ALLION.

P. foliis ellipticis, subtus farinosis, umbella nutante, corollae tubo longissimo.

P. longiflora Allion. *Flor. ped.* 1. p. 92. n. 335. t. 39. f. 3. *Weld. Mont. ros.* p. 66. *Jacquin, Miscel. austr.* 1. p. 159. n. 7. ejusd. *Fl. austr. app.* t. 46.

Nascitur in alpibus Garrexii *le Careense*; in valle Macre prope la *Brusa*, et in alpibus di *Vrait* (*Allioni, Balbis!*) In mont. della valle di *Fieme*. (*Scopoli*), atque in monte Rosa (*Welden.*)

Virtus Medica Primularum.

Omnes inter primularum species hucusque exaratas *Primula officinalis* tantum et *Primula Auricula* Medicinae inserviunt. Folia ac praecipue flores in hujusmodi usum veniunt. Et primitus de medicis primulae officinalis virtutibus, licet aevo nostro perraro adhibeatur, aliquid referam. Hujusce plantulae flores, cacteris praetermissis principiis, oleo probabiliter aromatico informantur, nervis amico, quod licet eorum vim excitare immo robur addere queat, nimis graviter tamen ipsos haudquaquam adficit. Officinis vero aquam distillatam et conservam primulae officinalis largiuntur; quae in apoplexia ac paralyti, praesertim linguae, ejusque haesitantia proficue usurpantur (1).

Aqua ab unc. jv. ad vj., conserva vero ab unc. ÷ ad unc. j. praescribitur, quin ullum adjungatur pharmacum, vel interdum quaedam opiata, ubi nullum obstat momentum, una porriguntur.

Distillationis ope spiritus quoque elicitur iisdem praeditus facultatibus, cujus tamen virtus magis evoluta cum sit, majorem aequae prudentiam quoad dosim injungit. Horum quoque florum infusum in aqua ferventi ceu potus theatus praescribi solet. Pugillus

(1) Chomel. l. c. et Barthol. in Eph. N. C. Dec. 1. Ann. 2. obs. 2. p. 4.

nempe unus in aquae unc. vj. aut man. ÷ in jussculo vitulino usurpatur.

Rajus refert, foliorum ac florum succum aequali vaccini lactis quantitati commixtum capitis inveteratum ac pertinacem dolorem sanasse; testaturque etiam cum *D. Hulse* radicum decoctionem optimum vertiginem adversum suppeditare remedium. Nec reticendum praeterea, clar. *Unzer* primulae officinalis folia aegrotis lactumine adfectis opitulari, compertum habuisse (1).

Quoad externum primulae officinalis usum, ejus flores cataplasmatibus forma in arthriticis doloribus, ac articulationum morbis aliquando efficacissimiprehenduntur. *Bartholinus* ait, paralyticum in sinistro latere sanasse fomento ex cerevisiae spiritu parato in quo primula veris ebullit — *Schorderius* veluti optimum remedium depraedicat acetum, quod infusam hujusque plantae radicem recepit, ad dentium dolores sanandos, dummodo naribus inspiretur.

Florum succus aut aqua distillata faciem, maculasque cutaneas, linimenti forma usurpatus, detergit.

Flores autem Primulae officinalis, qui a calycibus debent bene esse mundati, celeriter siccati et loco sicco servati, ne pallescant, nonnulla adhuc ingrediuntur pharmaca, olim praesertim commendata, quorum expositionem inane opus esse adnotamus.

(1) *Unzer Medic. Handbuch.* p. 455.

Herba quum omni fragrantia non destituatur, hinc una cum floribus propinata quandoque offenditur. Ob oleraceam tamen naturam apud Anglos ad acetaria placentasque sumitur (1) eidemque officio et apud Belgas inservit (2).

Radix quatenus odore anisi et sapore adstringente gaudet, iners aequae substantia non est aestimanda. Pulvis ejusdem naribus attractus sternutationem excitat (3).

Primula Auricula inter remedia absoleta nunc demandatur; vires tamen habet subadstringentes. Radix usurpatur a Venatoribus in Alpibus helveticis et Pyrroneis ad arcendam vertiginem. Auriculi ursi adhibentur radix, folia et flores, qui suaveolenti sunt.

FINIS.

(1) Ray. l. c.

(2) Boerhaav. l. c.

(3) Floyer pharmacopaeos p. 169.

THESES DEFENDENDAE.

•••••

I.

Pharmaca virtute depilatoria praedita
melius, quam crudelis capillorum
evulsio, tinae medentur.

II.

Aurorae Boreales electro-magneticum
phaenomenon sistunt.

III.

Acetum farinae seminum sinapis com-
mixtum remedii virtutem vel im-
minuere vel destruere queit.

IV.

Vegetabilia, quae ob characterum ex-
ternorum, internaеque structurae
analogiam in unam conferuntur fa-
miliam, iisdem vix non semper me-
dicatis informantur virtutibus.

V.

Capilli et prudentia inimicitiam ut plurimum habent.

VI.

Nullum essenziale discrimen, quoad proximam morbi causam, est inter diabetem mellitum et insipidum.

VII.

Fallax est opinio illorum, qui ponunt scirrhum ex diathesi aeque scirrhosa corpori inhaerente oriri.

